

Autoevaluación: ¿Usted lo sabe?

1. Tomando en cuenta la diversidad de patologías que afectan al hígado, en algunos pacientes es necesario realizar:

- a) Ecosonograma abdominal.
- b) Biopsia hepática.
- c) Perfil inmunológico.
- d) Ninguno de las anteriores.

2. Algunas causas de hiperamonemia en niños son:

- a) Hemorragia gastrointestinal.
- b) Defectos en el ciclo de la urea.
- c) Insuficiencia hepática.
- d) Todas las anteriores.

3. La hiperamonemia puede ser:

- a) Congénita.
- b) Adquirida.
- c) Solo A y B son correctas.
- d) Ninguna de las anteriores.

4. Con respecto al ultrasonido endoscópico:

- a) Permite evaluar en detalle el parénquima del páncreas, los ductos pancreáticos y estructuras adyacentes.
- b) Juega un papel esencial para el estudio de enfermedades pancreáticas.
- c) Es el método de referencia para individualizar procesos inflamatorios o tumorales pancreáticos.
- d) Todas son correctas.

5. Con respecto a la colangioscopia peroral utilizando el sistema de visualización directa SpyGlass:

- a) Es un sistema con 2 operadores que permite no sólo visualización óptica, sino también toma de biopsias guiadas ópticamente.
- b) Es un sistema mono operador que permite no sólo visualización óptica, sino también toma de biopsias guiadas ópticamente.
- c) Es un sistema mono operador que permite sólo la visualización de la vía biliar.
- d) Solo b es correcta.

6. La enfermedad hepática descompensada se define como:

- a) El desarrollo de ascitis, hemorragia variceal, encefalopatía hepática, ictericia y Carcinoma Hepatocelular (HCC).
- b) La enfermedad hepática descompensada se define como el desarrollo de ascitis, encefalopatía hepática, ictericia.
- c) La enfermedad hepática descompensada se define como el desarrollo de ascitis, hemorragia variceal, encefalopatía hepática.
- d) Solo A es correcta.

7. La complicación más común en pacientes con hipertensión portal es:

- a) Ascitis y hemorragia digestiva variceal.
- b) Encefalopatía hepática.
- c) Ascitis.
- d) Solo A es correcta.

8. Las prótesis esofágicas son utilizadas como:

- a) Terapia paliativa en pacientes con disfagia maligna avanzada.
- b) Como paliación primaria, o para recidiva en quienes ya hayan recibido alguna forma de tratamiento.
- c) También están indicadas en fístulas esófago-traqueo bronquiales.
- d) Todas son correctas.

9. La perforación esofágica espontánea (PEE) o síndrome de Boerhaave se define como:

- a) La rotura del esófago no relacionada con traumatismos, exploraciones invasivas, patología esofágica previa o cuerpos extraños.
- b) La rotura del esófago relacionada con traumatismos, exploraciones invasivas, patología esofágica previa o cuerpos extraños.
- c) La rotura del esófago no relacionada con traumatismos, solo con exploraciones invasivas.
- d) Solo A es correcta.

10. El manejo definitivo de los GIST es:

- a) Quirúrgico.
- b) Médico.
- c) A y B son correctas.
- d) Solo A es correcta.

Las respuestas aparecen en la página XI respectivamente.