

Autoevaluación: ¿Usted lo sabe?

1. Los factores de riesgo para Hepatocarcinoma son:

- A) El excesivo consumo de alcohol
- B) La ingesta de aflatoxina
- C) Cirrosis hepática
- D) Todas son correctas

2. Radiológicamente el hepatocarcinoma se caracteriza por:

- A) Lesión ecolúcida redondeada
- B) Patrón vascular típico
- C) Patrón nodular
- D) Solo A y C son correctas

3. Con endoscopios convencionales la infección por *H. Pylori* pueden verse:

- A) A intervalos regulares en mucosa gástrica normal
- B) Áreas rojizas dispersas
- C) Red vascular o venulae colectoras de la capa superficial de la mucosa
- D) Ninguna de las anteriores

4. ¿Cuál es la mejor técnica para evaluar lesiones del colon?

- A) Colon x Enema
- B) Radiografía de Abdomen Simple
- C) Colonoscopia
- D) Todas son correctas

5. Con respecto a los tumores de diseminación lateral de colon:

- A) Son mayores de 5mm
- B) Son mayores de 8mm
- C) Son mayores de 10mm
- D) Ninguna es correcta

6. La lesión focal hepática se define como:

- A) Formación de contenido sólido o líquido que no forma parte de la anatomía normal del hígado.
- B) Formación de contenido sólido o líquido que forma parte de la anatomía normal del hígado.
- C) Formación de contenido sólido que forma parte de la anatomía normal del hígado.
- D) Ninguna es correcta

7. Una causa adquirida de la estenosis Antral en niños es:

- A) Estenosis hipertrófica del píloro
- B) Enfermedad granulomatosa
- C) Ingestión de cáustico
- D) Diafragma antral

8. La primera línea de tratamiento para la obstrucción del tracto de salida gástrico es:

- A) Terapia endoscópica
- B) Quirúrgica
- C) Endoscópica-Quirúrgico
- D) Ninguna de las anteriores

Las respuestas aparecen en la página XI respectivamente.