

Autoevaluación: ¿Usted lo sabe?

1. Las vías de transmisión del virus de la hepatitis C es:

- a) Solo a través de transfusiones sanguíneas.
- b) Uso de drogas intravenosas, tatuajes.
- c) Transmisión sexual.
- d) Todas son correctas.
- e) Solo B y C son correctas.

2. La condición o enfermedad celíaca (EC) se define actualmente como:

- a) Intolerancia a la avena y otros cereales.
- b) Intolerancia permanente a la gliadina del trigo y otras proteínas afines.
- c) Intolerancia a los carbohidratos.
- d) Intolerancia a las harinas.

3. En la condición celíaca se genera:

- a) Atrofia de las glándulas caliciformes en individuos predispuestos genéticamente.
- b) Atrofia de las glándulas fúndicas en individuos predispuestos genéticamente.
- c) Atrofia de las vellosidades intestinales en individuos predispuestos genéticamente.
- d) Ninguna es correcta.

4. La positividad del HER2 es mayor en adenocarcinoma gástrico:

- a) Difuso.
- b) Mixto.
- c) Intestinal.
- d) En todos es igual.

5. La hepatitis autoinmune (HAI) tipo 1 se caracteriza por:

- a) Elevación de aminotransferasas e hipergammaglobulinemia.
- b) Elevación de aminotransferasas, presencia de auto anticuerpos e hipergammaglobulinemia.

- c) Elevación de aminotransferasas y presencia de auto anticuerpos.
- d) Ninguna de las anteriores.

6. En la hepatitis autoinmune (HAI) tipo 1 los estudios inmunohistoquímicos identifican:

- a) Los linfocitos T CD4+ predominantemente y en menor cuantía los linfocitos T CD8+.
- b) Los linfocitos T CD4+ y predominantemente en mayor cuantía los linfocitos T CD8+.
- c) Los linfocitos TCD4 y CD 8 por igual.
- d) Ninguna de las anteriores.

7. Factores de riesgo para la colelitiasis en niños y adolescentes:

- a) Trastornos hemolíticos.
- b) Obesidad.
- c) Antecedentes familiares de cálculos biliares.
- d) Todas las anteriores.

8. Con respecto a la esofagitis eosinofílica:

- a) Existen más de 40 eosinófilos por campo de mayor aumento en 1 o más biopsias.
- b) Existen menos de 15 eosinófilos por campo de mayor aumento en 1 o más biopsias.
- c) Existen más de 15 eosinófilos por campo de mayor aumento en 1 o más biopsias.
- d) Ninguna es correcta.

9. En relación a la Tuberculosis gastrointestinal el sitio digestivo mas afectado es:

- a) Colon.
- b) Estómago.
- c) Esófago.
- d) Íleon terminal.

Las respuestas aparecen en la página XIV respectivamente.