

Autoevaluación: ¿Usted lo sabe?

1. Actualmente, ¿Cuáles son los marcadores serológicos para enfermedad celiaca?

- A. Anticuerpos anti-gliadina IgG/IgA, anti-transglutaminasa IgG/IgA, anti-endomisiales (EMA).
- B. Anticuerpos anti-gliadina IgG/IgA, anti-transglutaminasa IgG/IgA.
- C. Anticuerpos anti-gliadina IgG/IgA, anti-transglutaminasa IgG/IgA, anti-endomisiales (EMA), y anti-péptidos deaminados de gliadina (anti-DGPs).
- D. Ninguno de los anteriores.

2. ¿Cuál de estos marcadores serológicos no es específico en enfermedad celiaca?

- A. anti-gliadina IgG/IgA.
- B. Anti-transglutaminasa IgG/IgA.
- C. Anti-endomisiales (EMA).
- D. Anti-péptidos deaminados de gliadina (anti-DGPs).

3. La importancia del SNP rs12979860 del gen IL28B en hepatitis C radica en:

- A. Su asociación probada con los síntomas del paciente.
- B. Su asociación probada con la respuesta al tratamiento combinado de INF- α pegilado y ribavirina en pacientes con hepatitis crónica C genotipo 1.
- C. Su asociación probada con la respuesta al tratamiento combinado de INF- α pegilado y ribavirina en pacientes con hepatitis crónica C genotipo 1 y a la clínica.
- D. Ninguna de las anteriores.

4. La clasificación de Mayo se utiliza en:

- A. Enfermedad de Crohn.
- B. Enfermedad Celiaca.
- C. Colitis Ulcerosa.
- D. Ninguna de las anteriores.

5. El rendez vous guiado por ultrasonido endoscópico (USE) es una opción para tratar:

- A. Pacientes con cáncer de páncreas.
- B. Pacientes que requieren drenaje biliar percutáneo.
- C. A y B son correctas.
- D. Ninguna es correcta.

6. La curación mucosa endoscópica en enfermedad inflamatoria intestinal se asocia con:

- A. Remisión clínica sostenida, reducción de hospitalizaciones y cirugía.
- B. Remisión clínica sostenida.
- C. Remisión clínica sostenida y cirugía.
- D. Todas son correctas.

7. De acuerdo a las guías de práctica clínica de la European Crohn's and Colitis Organization (ECCO), la remisión de la colitis ulcerosa se define como:

- A. Una resolución completa de los síntomas.
- B. Curación endoscópica de la mucosa intestinal.
- C. Resolución completa de los síntomas y la curación endoscópica de la mucosa intestinal.
- D. Todas son correctas.