



Autoevaluación: ¿Usted lo sabe?

1. De acuerdo al artículo ultrasonido abdominal en pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana, la alteración ecosonográfica mas frecuente fue en:

- A) Páncreas.
- B) Hígado.
- C) Riñón.
- D) Ninguna.

2. Según el artículo ultrasonido abdominal en pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana, cual de las alteraciones hepáticas fue más frecuente:

- A) Aumento de la ecogenicidad del parénquima.
- B) Hepatomegalia.
- C) Abscesos.
- D) Lesiones focales.

3. En la estenosis papilar benigna el estudio de elección para hacer el diagnóstico es:

- A) Rx de abdomen simple de pie.
- B) Laboratorio.
- C) Colangiografía endoscópica.
- D) Ecosonograma abdominal.

4. En la colangiografía endoscópica de una estenosis papilar benigna los hallazgos son:

- A) Papila aumentada de tamaño.
- B) Dilatación de la vía biliar intrahepática.
- C) A y B son correctas.
- D) Dilatación vía biliar extra hepática y disminución del colédoco intrapapilar en "punta de lápiz".

5. Las causas más frecuentes de hemorragia digestiva no variceal son:

- A) Gastritis erosiva.
- B) Úlcera péptica.
- C) Desgarro de Mallory-Weiss.
- D) Lesión de Dieulafoy.

6. Los predictores de mala evolución en hemorragia digestiva no variceal son:

- A) Úlceras grandes (>15mm).
- B) Úlceras profundas (>3 a 4mm de profundidad).
- C) Úlceras duodenales en la cara posterior y/o inferior del bulbo duodenal.
- D) Todas las anteriores.

7. La causa más frecuente de hepatocarcinoma es:

- A) Factores metabólicos.
- B) Hepatitis B y C.
- C) Hígado graso.
- D) Cirrosis hepática.

