

Insulinorresistencia, obesidad y síndrome metabólico. Cohorte CDC de Canarias en Venezuela

Miguel Viso¹, Zulma Rodríguez^{1,2}, Luis Aponte, Ana Barboza¹, Paola Barreto¹, Merlín Villamizar^{1,2}, Antonio Cabrera de León^{5,6}, Yolima Fernández^{1,3}, Elissa Galdona^{1,2}, Aldo Reigosa^{1,7}, Carlos Callegari^{1,4}

RESUMEN

La obesidad es una enfermedad crónica, problema de salud pública, con alta morbilidad asociada a resistencia a la insulina (RI). El síndrome metabólico (SM) predice enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2, siendo la obesidad y la RI los principales factores de riesgo. El HOMA es un indicador validado de RI simple, de bajo costo y poco invasivo. El objetivo fue determinar RI (HOMA) y su relación con el estado nutricional, en adultos canario-venezolanos con y sin diagnóstico de SM. La muestra incluyó 67 personas (20-84 años), canarios e hijos mayores de 19 años residentes en Venezuela, 23 con SM y 44 controles. Se determinó antropometría, presión arterial y análisis en ayuno de glucosa, HDL-colesterol, triglicéridos e insulina. Los obesos, en comparación con los eutróficos, presentaron valores significativamente superiores de HOMA ($3,63 \pm 1,27$ vs $2,33 \pm 0,52$, $p < 0,001$) así como de circunferencia de cintura, presión arterial diastólica, triglicéridos, glucosa, insulina y del índice triglicéridos/HDL-colesterol. La prueba de Chi² mostró asociación altamente significativa ($p < 0,001$) entre HOMA y SM. Los sujetos con SM demostraron tener 4,7 veces más riesgo de tener RI, siendo este hallazgo estadísticamente significativo. Para establecer la correlación entre las variables el análisis de Pearson demostró una correlación significativa ($p < 0,001$) entre HOMA y el índice de masa corporal, circunferencia abdominal, triglicéridos e Índice Triglicéridos/HDL-colesterol. La obesidad mostró alta asociación con insulinorresistencia. Concluyendo que la obesidad, la hipertrigliceridemia y el índice Triglicéridos/HDL-colesterol elevado son parámetros para RI.

Palabras clave: Resistencia a la insulina, estado nutricional, obesidad, síndrome metabólico.

ABSTRACT

Insulin resistance, obesity and metabolic syndrome. Cohort CDC Canarian in Venezuela

Obesity is a chronic disease, a public health problem, with high morbidity associated to the insulin resistance (IR). Metabolic syndrome (MS), predicts cardiovascular disease and type 2 diabetes, being obesity and IR the main risk factors. HOMA, is a simple validated marker for IR, non invasive and inexpensive. The objective was to estimate IR and its relation with the nutritional status of canarian-venezuelan adults with and without MS. The sample was comprised of 67 adults (20-84 years old), born in canaries islands and their children older than 19 years of age living in Venezuela, 23 with MS and 44 controls. Anthropometric measurements, blood pressure, fasting glucose, HDL-cholesterol, triglycerides and insulin were performed in each individual. Subjects with obesity showed significantly higher values of HOMA ($3,63 \pm 1,27$ vs $2,33 \pm 0,52$, $p < 0,001$) as well as abdominal circumference, diastolic blood pressure, triglycerides, glucose, insulin and triglycerides/HDL-cholesterol, when compared to the eutrophic subjects. The Chi² test showed a highly significant association ($p < 0,001$) between HOMA and MS. MS subjects had 4.7 times more risk for IR, being this finding statistically significant. To establish the correlation between variables was performed Pearson analysis demonstrating a significant correlation between HOMA and body mass index (BMI), abdominal circumference, triglycerides and triglycerides/HDL-cholesterol. Obesity showed a high association with insulin-resistance. Concluding that obesity, hypertriglyceridemia and high index triglycerides/HDL-cholesterol are high parameters for RI.

Key words: Insulin-resistance, nutritional status, obesity, metabolic syndrome

INTRODUCCIÓN

La obesidad es una enfermedad crónica, que en los últimos 30 años se ha convertido en un problema de salud pública (1). Como epidemia, su causa es claramente medioambiental (estilo de vida sedentario y malnutrición por exceso [ME]), pero en el ámbito individual su origen es multifactorial, combinando la predisposición genética con el estilo de vida (2).

La ME se asocia con el síndrome metabólico (SM), que se define como un grupo de factores de riesgo interrelacionados que promueven el desarrollo de enfermedades cardiovasculares (ECV) y diabetes tipo 2 (3, 4). Por otra parte, la ME también está estrechamente relacionada con la resistencia a la insulina (RI) (4), que es la disminución de la capacidad de esta hormona para ejercer sus acciones biológicas en tejidos diana e igualmente promueve ECV y diabetes tipo 2 (5, 6).

El índice HOMA (*Homeostasis Model Assessment*) permite realizar estimaciones de resistencia insulínica mediante

¹Centro de Investigaciones Médicas y Biotecnológicas (CIMBUC). Universidad de Carabobo

²Dpto de Cs Morfológicas y Forenses. Escuela de Cs Biomédicas y Tecnológicas. Facultad de Cs de la Salud. Universidad de Carabobo

³Dpto de Investigación y Desarrollo Profesional. Escuela de Bioanálisis. Facultad de Cs de la Salud. Universidad de Carabobo.

⁴Department of Medicine. Morsani College Medicine. Director International Academy of Medicine. University of South Florida Tampa.

⁵Unidad de Investigación. Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Tenerife. España.

⁶Universidad de la Laguna. Tenerife. España.

⁷Dpto Morfofisiopatología. Escuela de Bioanálisis. Facultad de Cs de la Salud. Universidad de Carabobo.

Correspondencia: Zulma Rodríguez

Email: zjrodriguez@uc.edu.ve

Recibido: Abril 2012

Aprobado: Febrero 2013

las concentraciones de glucosa e insulina plasmáticas en ayuno (7). Se le ha comparado y validado con el método del clamp euglicémico hiperinsulinémico (8). Por otro lado, en un estudio realizado en Estados Unidos se demostró que el SM e índice de sensibilidad a la insulina de Gutt, pero no el HOMA son predictores independientes de ECV (9).

En España, aproximadamente el 30% de los adultos de 35 a 74 años de edad presenta obesidad y casi la misma proporción padece SM, siendo las Islas Canarias una de sus regiones con mayor prevalencia de ambos procesos. En Venezuela, en relación a la ME en adultos, se destaca un estudio realizado en el occidente del país (estado Zulia), que encontró que un cuarto de la población mayor de 20 años presentaba obesidad y un tercio sufría SM (10). Asimismo, el estudio CARMELA (*Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation in Latin America*), que incluye 7 ciudades de Latinoamérica, demostró la siguiente prevalencia de obesidad y SM respectivamente, Ciudad de México (31% y 27%), Barquisimeto (Venezuela) (25% y 26%), Santiago de Chile (27% y 21%), Bogotá (18% y 20%), Lima (22% y 18%), Buenos Aires (20% y 17%) y Quito (16% y 14%) (11, 12). En una muestra de canarios residentes en Venezuela, se reportó recientemente una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (obesidad general y abdominal, SM, dislipidemia y diabetes) (13).

Existe una estrecha relación entre las Islas Canarias y Venezuela pues, hasta mediados de los años 70, aproximadamente 20% de la población canaria había emigrado a Venezuela, en número estimado de 400.000 (14). Esto dota de especial interés el estudio de problemas de salud en esta comunidad canario-venezolana, pues puede servir como referente poblacional tanto para otras comunidades venezolanas como para comunidades españolas, particularmente la población de las Islas Canarias. El objetivo de este estudio fue determinar RI (HOMA) y su relación con el estado nutricional, en adultos canario-venezolanos con y sin diagnóstico de SM.

MATERIAL Y MÉTODOS

El CDC de Canarias en Venezuela (Cáncer, Diabetes y enfermedad Cardiovascular), producto de un convenio entre la Universidad de Carabobo (Venezuela) y la Universidad de La Laguna (Canarias, España), es un estudio epidemiológico que evalúa factores asociados con las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto en la comunidad Canaria residente en Venezuela (15).

Se trató de una investigación de tipo descriptivo, correlacional de corte transversal y de muestra no probabilística intencionada. La población estuvo constituida por adultos con y sin SM, pertenecientes a la cohorte CDC de Canarias en Venezuela, enrolados durante el año 2009, quienes fueron contactados a través de fundaciones y clubes españoles ubicados en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes y Yaracuy.

Se excluyeron aquellas personas tratadas con ácido valproico, corticosteroides, agonistas beta-adrenérgicos, insulina, estrógenos, andrógenos, hormona del crecimiento y/o tiroxina, así como presencia de diabetes, intolerancia a la glucosa, cáncer, SIDA, insuficiencia renal, síndrome de

Cushing o patología tiroidea (hipertiroidismo o hipotiroidismo) y gestantes.

La muestra quedó conformada por 67 individuos (23 con síndrome metabólico y 44 controles sin síndrome metabólico), entre 20 y 84 años de edad, nacidos en las Islas Canarias o al menos con uno de los padres nativo de las Islas.

El diagnóstico de SM se estableció de acuerdo a la presencia de 3 o más factores según ATP III (5); sin embargo, para la circunferencia abdominal se utilizó el punto de corte según IDF para la población europea (16). El grupo control estuvo conformado por aquellos individuos que presentaron dos, uno o ninguno de los criterios para definir SM.

Criterio para el diagnóstico de síndrome metabólico

Circunferencia de cintura	≥ 94 cm en hombres y ≥ 80 cm en mujeres
Triglicéridos	≥ 150 mg/dL o en tratamiento con drogas para Hipertrigliceridemia
HDL-C	< 40 mg/dL en hombres o < 50 < 40 mg/dL en mujeres o en tratamiento con drogas para HDL-colesterol reducido mg/dL en mujeres o en tratamiento con drogas para HDL-colesterol reducido
Presión arterial	≥ 130 mmHg presión arterial sistólica o ≥ 85 mmHg presión arterial diastólica o en tratamiento con drogas antihipertensivos en un individuo con historia de hipertensión arterial.
Glicemia (ayuno)	≥ 100 mg/dL.

Las personas fueron entrevistadas con un cuestionario que forma parte del Proyecto de Investigación "CDC de Canarias en Venezuela", el cual está disponible en www.cdcdecarnarias.org. Asimismo, a cada individuo se le solicitó autorización para participar en el estudio mediante la firma de un "Consentimiento Informado". El estudio ha sido autorizado por el comité de ética del Hospital Universitario Ángel Larralde en Venezuela.

Evaluación bioquímica: se realizó previo ayuno de doce horas. Se procedió a la extracción de 10 mL de sangre por punción venosa el mismo día de la evaluación médica. Cada muestra se colocó en un tubo de polietileno limpio y seco sin anticoagulante. Posteriormente se procedió a centrifugar a 3.500 rpm, separando el suero y colocándolo en alícuotas de 0,5 mL, que luego se congelaron a -80°C hasta el momento de determinar la concentración de insulina. La determinación de glucosa, HDL colesterol y triglicéridos se realizaron en el mismo día de la extracción de la muestra.

La glucosa fue evaluada por el método enzimático-colorimétrico. Se considera valor de referencia en ayuno: < 100 mg/dL (17). Se empleó el método enzimático para la determinación de HDL en suero y se tomaron como valores de referencia para hombres ≥ 40 mg/dL y mujeres ≥ 50 mg/dL (18). Para determinar los triglicéridos se empleó el método enzimático colorimétrico, con un valor de referencia: < 150 mg/dL (18). El Índice Triglicéridos/HDL-colesterol se calculó

mediante el cociente de los niveles de triglicéridos entre las concentraciones de HDL-colesterol. Se consideró alto un valor mayor o igual a 3 (19). El método empleado para la determinación de insulina fue el inmunoenzimático (ELISA) (20). El índice de resistencia a la insulina (HOMA) se calculó según la fórmula: $(\text{insulina } \mu\text{IU/mL} \times \text{glucosa mmol/L})/22,5$, se consideró insulino-resistencia: $\text{HOMA} \geq 2,5$ (21).

Evaluación médica: se tomó el peso (kg) y la talla (m) (22). La presión arterial (mmHg) se tomó en dos oportunidades con intervalos de cinco minutos (5). Para la determinación de la circunferencia de cintura expresada en centímetros (cm), la cinta métrica se colocó en el borde superior de la cresta iliaca derecha y luego se trasladó alrededor del abdomen, siguiendo un plano horizontal, hasta el borde superior de la otra cresta iliaca (4). Luego se calculó el índice de masa corporal (IMC: $\text{Peso (kg)} / \text{Talla}^2 (\text{m}^2)$). Los individuos fueron clasificados de acuerdo a su índice de masa corporal, según referencias de OMS (23).

Análisis estadístico: las variables continuas fueron resumidas mediante su media $\pm$ DE y las categóricas a través de la frecuencia absoluta y relativa. La prueba Chi² de Pearson se empleó para estudiar la asociación entre variables categóricas. La prueba t de Student se utilizó para comparar los promedios entre dos variables. La correlación entre variables continuas se estimó con el coeficiente de Pearson. Se consideró estadísticamente significativo un valor $p < 0,05$. Se estimó el riesgo relativo a través del *odds ratio* (OR), con sus respectivos intervalos para 95% de confianza. Para la realización del análisis estadístico se utilizó el programa estadístico SPSS versión 12.0 en español (24).

RESULTADOS

La muestra estuvo constituida por 67 sujetos de ambos géneros entre 20 y 84 años. El 58,2% estuvo conformado por individuos con edades comprendidas entre 20 y 49 años, y 41,8% entre 50 y 84 años, predominando en ambos grupos el género femenino: 59% vs. 41% en los más jóvenes, y 64,3% vs. 35,7% en los de mayor edad.

La edad promedio en la muestra correspondió a $48,18 \pm 17,16$ años. Los valores promedios de los parámetros antropométricos fueron: $27,71 \pm 4,38 \text{ kg/m}^2$ para el índice de masa corporal y $95,55 \pm 12,57 \text{ cm}$ cuando se trató de la circunferencia de cintura ($103,24 \pm 11,88 \text{ cm}$ en hombres y $90,68 \pm 10,48 \text{ cm}$ en mujeres), igualmente, la presión arterial sistólica y diastólica correspondió a $124,75 \pm 23,83 \text{ mm Hg}$ y $75,96 \pm 10,03 \text{ mm Hg}$ respectivamente.

Las concentraciones séricas de las variables bioquímicas, en ayuno de 12 horas, mostraron los siguientes promedios: HDL-colesterol $46,27 \pm 9,05 \text{ mg/dL}$ ($41,8 \pm 7,23 \text{ mg/dl}$ en hombres y $49,1 \pm 9,02 \text{ mg/dL}$ en mujeres), triglicéridos $123,88 \pm 66,36 \text{ mg/dL}$, glucosa $86,42 \pm 7,35 \text{ mg/dL}$ e insulina $14,94 \pm 4,82 \mu\text{IU/mL}$. El HOMA y el índice triglicéridos/HDL-colesterol mostraron una cifra promedio de $3,20 \pm 1,11$ y $2,79 \pm 1,57$ respectivamente.

Los obesos en comparación con los eutróficos presentaron valores significativamente superiores de IMC, circunferencia de cintura, presión arterial diastólica, triglicéridos, glucosa, insulina, HOMA y del índice triglicéridos/HDL-colesterol. La presión arterial sistólica y HDL-colesterol no revelaron diferencias significativas entre los dos grupos (Tabla 1).

Tabla 1. Variables clínicas y bioquímicas. Comparaciones según estado nutricional (n=38)

Estado nutricional					
Variable	Eutrófico (n=16)	Obesidad (n=22)	F ^a	T ^b	p
Índice de masa corporal (kg/m ²)	22,13 $\pm$ 1,51	32,73 $\pm$ 2,19	3,134	-16,588	0,000*
Circunferencia de cintura (cm)	81,84 $\pm$ 6,12	108,16 $\pm$ 7,28	0,946	-11,734	0,000*
Presión arterial sistólica (mmHg)	123,19 $\pm$ 33,48	133,14 $\pm$ 19,02	1,149	-1,163	0,253
Presión arterial diastólica (mmHg)	73,06 $\pm$ 9,95	80,86 $\pm$ 8,81	0,189	-2,551	0,015*
HDL-colesterol (mg/dL)	48,25 $\pm$ 9,44	44,90 $\pm$ 8,40	0,019	1,152	0,257
Triglicéridos (mg/dL)	84,06 $\pm$ 28,70	160,77 $\pm$ 74,84	9,587	-4,384	0,000*
Glucosa (mg/dl)	80,44 $\pm$ 7,71	88,50 $\pm$ 6,40	0,601	-3,516	0,001*
Insulina ($\mu\text{IU/mL}$)	11,83 $\pm$ 2,76	16,75 $\pm$ 5,97	10,276	-3,390	0,002*
HOMA	2,33 $\pm$ 0,52	3,63 $\pm$ 1,27	11,779	-4,308	0,000*
Triglicéridos/ HDL-colesterol	1,81 $\pm$ 0,75	3,67 $\pm$ 1,70	6,383	-4,522	0,000*

Valores expresados en promedio $\pm$ DE

* $p < 0,05$ estadísticamente significativo ^a: Prueba de ANOVA (F) entre los grupos ^b: Prueba de Student (T)

Un porcentaje importante de la muestra (61,2%) mostró resistencia a la insulina ($\text{HOMA} \geq 2,5$).

De acuerdo al estado nutricional, un valor alto de HOMA predominó en las personas con sobrepeso (69%) u obesidad

(77,3%), en cambio, la mayor parte de los eutróficos (75%) fueron insulinosensibles ($\text{HOMA} < 2,5$). La prueba de χ^2 reveló una asociación significativa ($p < 0,01$) entre HOMA y estado nutricional (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de frecuencia de los individuos según HOMA y estado nutricional

HOMA	Estado nutricional (X: 11,959; p: 0,003)			
	Eutrófico	Sobre peso	Obesidad	
	n (%)	n (%)	n (%)	Total (%)
Normal (<2,5)	12 (75)	9 (31)	5 (22,7)	26 (38,8)
Alto ($\geq 2,5$)	4 (25)	20 (69)	17 (77,3)	41 (61,2)
Total	16 (100)	29 (100)	22 (100)	6,7 (100)

Aproximadamente la mitad de los sujetos resistentes a la insulina (53,6%) no presentaron SM, sin embargo, casi todos los individuos con SM (82,6%) mostraron insulinorresistencia. La prueba de χ^2 señaló una asociación significativa ($p < 0,01$) entre HOMA y síndrome metabólico. Los sujetos con SM demostraron tener 4,7 veces más riesgo de tener resistencia a la insulina, siendo este hallazgo estadísticamente significativo (IC 95%= 1,389-16,243) (Tabla 3).

Tabla 3. Distribución de frecuencia de los individuos según HOMA y síndrome metabólico (ATP III modificado)

HOMA	Síndrome metabólico	Ausencia de síndrome metabólico	
	n (%)	n (%)	TOTAL %
Alto ($\geq 2,5$)	19 (82,6)	22 (50)	41 (61,2)
Normal (<2,5)	4 (17,4)	22 (50)	26 (38,8)
Total	23 (100)	44 (100)	67 (100)

Pearson $\chi^2=6,763$; $p=0,009$ (significativo)

Odds ratio: síndrome metabólico/ ausencia de síndrome metabólico: 4,7. IC 95%: 1,389-16, 243

Las correlaciones de Pearson entre HOMA y las otras variables, mostraron los siguientes resultados: el índice de masa corporal, circunferencia de cintura, triglicéridos

e índice triglicéridos/HDL-colesterol manifestaron una alta significancia ($p < 0,001$). El HOMA no demostró correlación significativa con la edad, HDL-colesterol y con la presión arterial (sistólica y diastólica) (Tabla 4).

Tabla 4. Correlaciones de Pearson entre la resistencia a la insulina (HOMA)

Variables	HOMA	
	Correlación de Pearson	p
Edad (años)	0,038	0,762
Índice de masa corporal (Kg/m ²)	0,415	0,000
Circunferencia de cintura (cm)	0,441	0,000
Presión arterial sistólica (mm Hg)	0,188	0,128
Presión arterial diastólica (mm Hg)	0,224	0,068
HDL-colesterol (mg/dL)	-0,238	0,052
Triglicéridos (mg/dL)	0,433	0,000
Triglicéridos/HDL-colesterol	0,497	0,000

DISCUSION

La insulinorresistencia (RI) se relaciona con un incremento en el riesgo cardiovascular (25), siendo la insulina sérica una medida indirecta de ésta. Estudios prospectivos han demostrado asociación entre las concentraciones de insulina y riesgo cardiovascular (26, 27). Como se ha referido, HOMA es un indicador de RI sencillo y de bajo costo, útil para estudios epidemiológicos y además ha sido validado con la prueba gold estándar (clamp euglicémico-hiper-insulinémico) (28, 29, 30, 31).

En este estudio se demuestra asociación entre obesidad y RI. La obesidad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 y, además, es la principal causa de morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular (30, 32, 33). En este sentido, resultados similares fueron encontrados en una investigación en 678 adultos de la Provincia de Albacete, España, los indicadores de obesidad (IMC, circunferencia de cintura y diámetro sagital abdominal) y las alteraciones del perfil lipídico (concentraciones séricas reducidas de HDL colesterol y elevadas de LDL- colesterol) se asociaron independientemente con el riesgo de presentar RI (34).

Diversos estudios han confirmado que el SM predice la incidencia de un evento cardiovascular (35, 36, 37), además, dicho síndrome se asocia con RI (35,38-41). El aumento en la RI presente en los individuos, estimada por HOMA, se relaciona con el incremento en el número de componentes del SM definidos por ATP III (25, 40, 42, 43). La RI juega un papel clave en la fisiopatología del SM habiéndose postulado como causa subyacente (40). Sin embargo, los individuos con SM no necesariamente son insulinorresistentes (25, 38, 42).

En el estudio, la mayoría de los individuos con SM presentaron insulinorresistencia, demostrándose una asociación significativa entre HOMA y SM. Igualmente la Odds ratio reveló que aquellos individuos con SM tienen

4,7 veces más riesgo de tener RI en comparación con los que no reúnen los criterios para dicho síndrome. La RI es un componente clave junto a la obesidad, en el desarrollo del SM. La presencia de RI puede estar determinada genéticamente, y luego al interactuar con factores externos que incluyen estilo de vida sedentario y dieta hipercalórica, conducen al desequilibrio metabólico que permite a futuro complicaciones cardiovasculares (7, 8, 33, 34).

Se demostró una baja a mediana correlación significativa ($r = 0,433$; $p < 0,001$) de la RI con el perímetro abdominal y los niveles séricos de triglicéridos. En este sentido, Cheal en un estudio con el objeto de evaluar la capacidad de los criterios de ATP III para identificar a los individuos insulinoresistentes, encontró que aunque existe asociación significativa entre RI y SM, la presencia de SM por ATP III no proporciona una sensibilidad adecuada para identificar sujetos con RI. Además, los componentes individuales de SM varían en su utilidad diagnóstica, considerando que la obesidad abdominal y la hipertrigliceridemia son los que mejor se relacionan con la RI (38).

El índice triglicéridos/HDL-colesterol (≥ 3), demostró ser predictor de RI (19) y está asociado con el riesgo de padecer infarto del miocardio (45). Un estudio realizado en 2652 adultos no diabéticos, en los Estados Unidos, demostró que el índice triglicéridos/HDL-colesterol fue un indicador útil de RI en blancos, afroamericanos y mexicanos; encontrándose una mayor asociación en los sujetos que no tenían sobrepeso en comparación con los obesos (46). Al contrario, en una investigación con 125 individuos de etnia afroamericana, ni los niveles séricos de triglicéridos ni el índice triglicéridos/HDL-colesterol mostraron ser un marcador de resistencia a la insulina al ser comparados con las concentraciones séricas de insulina, circunferencia de cintura e índice de masa corporal (46).

Encontramos una correlación positiva de HOMA con triglicéridos y con el índice triglicéridos/HDL-colesterol; que en la muestra estudiada pueden ser considerados marcadores metabólicos de RI. Ni la presión arterial ni las concentraciones de HDL-colesterol se correlacionaron con la resistencia a la insulina, quizás consecutivo al reducido tamaño de la muestra.

Constituye el primer estudio sobre resistencia a la insulina y su relación tanto con el estado nutricional como con el síndrome metabólico, realizado en adultos pertenecientes a la comunidad Canaria que vive en Venezuela.

En conclusión, en la muestra estudiada los obesos, en comparación con los normopeso, mostraron una disminución significativa de la sensibilidad a la insulina, estimada por HOMA, así como valores séricos superiores de triglicéridos, glucosa, insulina e índice triglicéridos/HDL-colesterol.

La obesidad (general o abdominal), así como la presencia de hipertrigliceridemia o de un índice triglicéridos/HDL-colesterol elevado son marcadores para identificar individuos con resistencia a la insulina. La insulinoresistencia (RI) mostró una correlación significativa ($p = 0,000$) con el índice de masa corporal (indicador de obesidad), circunferencia de cintura (indicador de obesidad central), así como con los

niveles séricos de triglicéridos y con el índice triglicéridos/HDL-colesterol. El SM incrementa el riesgo de resistencia a la insulina.

Agradecimientos. Los autores agradecen al Instituto Canario de Investigación en Cáncer (ICIC), Universidad La Laguna, Gobierno de Canarias y al Centro de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo (CDCH-UC), por el financiamiento para la realización de esta investigación bajo el proyecto Nro. 2008-001.

REFERENCIAS

1. Speakman J. Obesity: the integrated roles of environment and genetics. *J Nutr* 2004; 134:2090-2105.
2. Smyth S, Heron A. Diabetes and obesity: the twin epidemics. *Nat Med* 2006; 12:75-80.
3. Ford ES, Giles WH, Dietz WH. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults. *JAMA* 2002; 287: 356-359.
4. Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome. An American Heart Association/ National Heart, Lung and Blood Institute Scientific Statement. *Circulation* 2005; 112: 2735-2752.
5. National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. *Circulation* 2002; 106:3143-3421.
6. Maldonado Villalón JA, Ocampo Apolonio MA, Cortés Gallegos NL, Acosta Almanza JC, Chávez Carbajal JF, Álvarez Aguilar C, et al. Índice de resistencia a la insulina en mujeres obesas premenopáusicas con dislipidemia aterogénica y no aterogénica *Med Int Mex* 2009; 25:191-196.
7. Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, Turner RC. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. *Diabetología* 1985; 28:412-419.
8. Levy J, Manley S, Sutton P, Camps I. Beta-cell function assessed by the hyperglycaemic clamp: reproducibility compared with HOMA analysis from fasting values and factors influencing variability. *Diabetes* 1995; 44: 89-95.
9. Rutter MK, Meigs JB, Sullivan LM, D'Agostino RB, Wilson PW. Insulin Resistance, the Metabolic Syndrome, and Incident Cardiovascular Events in the Framingham Offspring Study. *Diabetes* 2005; 54: 3252-3257.
10. Florez H, Silva E, Fernandez V, Ryder E, Sulbarán T, Campos G et al. Prevalence and Risk Factors associated with metabolic syndrome and dyslipidemia in White, Black, Amerindian and Mixed Hispanics in Zulia State, Venezuela. *Diabetes Res Clin Pract* 2005; 69: 63-77.

11. Escobedo J, Schargrotsky H, Champagne B, Silva H, Boissonnet C, Vinueza R y colaboradores. Prevalence of the Metabolic Syndrome in Latin America and its association with sub-clinical carotid atherosclerosis: the CARMELA cross sectional study. *Cardiovascular Diabetology* 2009; 8:52.
12. Schargrotsky H, Hernández-Hernández R, Champagne BM, Silva H, Vinueza R, Silva Ayçaguer LC y colaboradores. CARMELA: assessment of cardiovascular risk in seven Latin American cities. CARMELA Study Investigators. *Am J Med.* 2008 Jan;121(1):58-65.
13. Viso M, Rodríguez Z, Loreto N, Fernández Y, Callegari C, Nicita G, González J, Cabrera de León A, Reigosa A. Riesgo cardiovascular: valoración inicial de la cohorte CDC de Canarias en Venezuela. *Invest Clin* 2011, 52 (4): 323-333.
14. Carnero Lorenzo, F, Nuez Yáñez, J, Barroso Ribal, C. Memoria final del estudio. La emigración isleña en la formación del tejido socioeconómico y cultural de canarias y venezuela. Septiembre 2009. Universidad de La Laguna, Grupo de Investigación en Economía Social de Canarias (GIESCAN):
15. CDC de Canarias [citado: Junio, 08 2011] Disponible en: <http://www.cdcdecnarias.org>.
16. International Diabetes Federation. Worldwide definition of the metabolic syndrome. Available at: http://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Metasyndrome_definition.pdf. Accessed August 24, 2005)
17. Bioclin. Quibasa Química Básica Ltda. Determinación de glucosa. Brasil; 2007.
18. Wiener Laboratorios S.A.I.C. Riobamba 2944. Director técnico: Viviana E. Cétola. Bioquímica. Argentina; 2000.
19. McLaughlin T, Abassi F, Cheal K, Chu J, Lamendola C, Reaven C. Use of the metabolic markers to identify overweight individuals who are insulin resistant. *Ann Intern Med* 2003; 139:802-809.
20. DRG Instruments, GmbH, a Division of DRG International Inc. Alemania; 2008.
21. Consenso nacional de diabetes tipo 2. Venezuela 2003; [citado: 15 nov 2009]; disponible en: www.svem.org.ve/pdf/Consenso.pdf.
22. López M, Landaeta M. Manual de crecimiento y desarrollo. Caracas: Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría; 2001.
23. World Health Organization. Obesity and overweight. [citado: Octubre 15 2009] Disponible en: <http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/obesity/en/>
24. Dawson- Saunders B, Trapp R. Bioestadística médica. México DF: El manual moderno; 1993.
25. Saely C, Aczel S, Marte T, Langer P, Guenter H, Drexel H. The Metabolic Syndrome, Insulin Resistance and Cardiovascular risk in Diabetic and Nondiabetic Patients. *J Endocrinol Metab* 2005; 90:5698-5703.
26. Wingard DL, Barret-Connor EL, Ferrara A. Is insulin really a heart disease risk factor? *Diabetes Care* 1995; 18:1299-1304.
27. Nilsson P, Nilsson JA, Hedblad B, Eriksson KF, Berglund G. Hyperinsulinemia as long-term predictor of death ischaemic heart disease in nondiabetic men: the Malmo Preventive Project. *J intern Med* 2003; 253: 136-145.
28. Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, Turner RC. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. *Diabetologia* 1985; 28:412-419.
29. Stern S, Williams K, Ferrannini E, DeFronzo R, Bogardus C, and. Stern M. Perspectives in diabetes. Identification of individuals with insulin resistance using routine clinical measurements. *Diabetes* 2005; 54:333-339.
30. DeFronzo RA, Ferrannini E. Insulin Resistance: a multifaceted syndrome responsible for NIDDM, obesity, hypertension, dyslipidemia and atherosclerotic disease. *Diabetes Care* 1991; 14:173-194.
31. Hernández Yero J, Tuero Iglesias A, Vargas González D. Utilidad del índice HOMA-IR con una sola determinación de insulinemia para diagnosticar resistencia insulínica. *Rev Cubana de Endocrinol.* 2011; 22(2):69-77.
32. Fernández Regalado R, Arranz Calzado M, Ortega Sam JA, Hernández Rodríguez J. Resistencia a la insulina y cambios metabólicos en adultos obesos. *Rev Cubana de Endocrinol.* 2011; 22 (2):78-90.
33. González Chávez A, Ureña Lagunes J, Lavielle Saramago M, Amancio Chassin O, Elizondo Argueta S, Hernández y Hernández H. Comparación de índices antropométricos como predictores de riesgo cardiovascular y metabólico en población aparentemente sana. *Rev Mex Cardiol* 2011; 22 (2): 59-67.
34. Simarro Rueda M, Carbayo Herencia J, Massó Orozco J, Artigao Rodenas LM, Carrión Valero L, División Garrote JA y colaboradores en nombre del Grupo de Enfermedades Vasculares de Albacete (GEVA). Relación de la resistencia a la insulina con diferentes medidas antropométricas y factores de riesgo cardiovascular en una población no diabética. *Endocrinol Nutr.* 2011; 58 (9):464-471.
35. Rutter MK, Meigs JB, Sullivan LM, D'Agostino RB, Wilson PW. Insulin Resistance, the Metabolic Syndrome, and Incident Cardiovascular Events in the Framingham Offspring Study. *Diabetes* 2005; 54: 3252-3257.
36. Onat A, Ceyhan A, Basar O, Erer B, Toprak S, Sansoy V. Metabolic syndrome: major impact on coronary risk in a population with low cholesterol levels: a prospective and cross-sectional evaluation. *Atherosclerosis* 2002; 165:285-292.
37. Sattar N, Gaw A, Scherbakova O, Ford I, O'Reilly D, Haffner S, et al. Metabolic syndrome with and without C-reactive protein as a predictor of coronary heart disease and diabetes in the West of Scotland Coronary Prevention Study. *Circulation* 2003; 108: 9414-9419.

38. Cheal K, Abassi F, Lamendola C, McLaughlin T, Reaven G, Ford E. Relationship to insulin resistance of the adult treatment panel III diagnostic criteria for identification of the metabolic syndrome. *Diabetes* 2004; 53:1195-1200.
39. Carr D, Utzschneider K, Hull R, Kodama K, Retzlaff B, Bruzell J, et al. Intra-abdominal fat is a major determinant of the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III Criteria for the Metabolic Syndrome. *Diabetes* 2004;53: 2087-2094.
40. Bonora E, Kiechl S, Willeit J, Oberhollenzer F, Egger G, Bonadonna R, et al. Metabolic Syndrome epidemiology and more extensive phenotypic description. Cross-sectional data from de Bruneck Study. *Int J Obes Metab Disord* 2003;27: 1283-1289.
41. Liao Y, Kwon S, Shaughnessy S, Wallace P, Hutto A, Jenkins A, et al. Critical evaluation of Adult Treatment Panel III criteria in identifying insulin resistance with dyslipidemia. *Diabetes Care* 2004; 27:978-983.
42. Hanley A, Wagenknecht L, D'Agostino R, Zinman B, Haffner S. Identification of subjects with insulin resistance and β -cell dysfunction using alternative definitions of the metabolic syndrome. *Diabetes* 2003; 52(11):2740-2747.
43. Resnick H, Jones K, Ruotolo G, Jain A, Henderson J, Lu W, Howard B. Insulin resistance, the metabolic syndrome, and risk of incident cardiovascular disease in nondiabetic American Indians: The Strong Heart Study. *Diabetes Care* 2003; 26:861-867.
44. Calderín Bouza R, Monteagudo Peña G, Yanes Quesada M, García Sáez J, Marichal Madrazo S, Cabrera Rode E y colaboradores. Síndrome metabólico y prediabetes. *Revista Cubana de Endocrinología* 2011;22(1):52-57.
45. Gaziano M, Hennekens C, O'Donnell C, Breslow J, Buring J. Fasting triglycerides, high density lipoprotein, and risk of myocardial infarction. *Circulation* 1997; 96:2520-2524.
46. Li C, Ford E, Meng Y, Mokdad A, Reaven G. Does the association of the triglyceride to high-density lipoprotein cholesterol ratio with fasting serum insulin differ by race/ethnicity? *Cardiovasc Diabetol* 2008 7:4.



The banner features the **Salus online** logo at the top center, flanked by the University of Carabobo crest on the left and the Faculty of Health Sciences logo on the right. Below the logo is a navigation bar with links: INICIO, INDICE, AUTORIDADES, ENLACES DE INTERES, and CONTACTOS. The main text welcomes visitors to **Salus online**, the journal of the Faculty of Health Sciences. It describes the journal as the official scientific publication for the faculty and mentions its focus on research from the university and other institutions. It also states that **Salus online** reproduces approved articles for publication by the Editorial Committee, following the requirements of the printed edition. A note indicates that **Salus online** reproduces the latest issues of **Salus** while the complete collection is available on the CID page. The Director Editor, Ricardo Montoreano, is listed. At the bottom, there are two URLs: <http://servicio.cid.uc.edu.ve/fcs/> and <http://salus-online.fcs.uc.edu.ve/>. The banner also includes images of the **Salus** journal cover and a portrait of Ricardo Montoreano.

Universidad de Carabobo

Salus online

Facultad de Ciencias de la Salud

Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud-Universidad de Carabobo

INICIO INDICE AUTORIDADES ENLACES DE INTERES CONTACTOS

Bienvenidos a **Salus online** La Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo

Salus es el órgano oficial de divulgación científica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo. Está destinada a la publicación de trabajos de investigación que realicen los miembros de la comunidad universitaria y de otras Instituciones de Educación Superior, Nacionales, e Internacionales.

Salus online sólo reproducirá los artículos aprobados para su publicación por el Comité Editor de acuerdo a los requisitos de la edición impresa. Los autores deberán seguir enviando sus originales a la dirección habitual de la revista.

Salus online sólo reproducirá los últimos números de **Salus**, mientras que la colección completa se la podrá encontrar, como siempre, en la página del CID.

Director Editor
Ricardo Montoreano

<http://servicio.cid.uc.edu.ve/fcs/>
<http://salus-online.fcs.uc.edu.ve/>

© 2003 - 2007 Ricardo Montoreano
© 2008 Salus Online - Derechos Reservados/All Rights Reserved